Es sind folgende Species:

1. Anodonta complanata Ziegl. in allen Altersstufen.
2. Anodonta piscinalis Nils. var.; von sehr breiter fasst niedlicher Form.
3. Unio pictorum L.
4. Unio batavus Lam.
5. Unio tumidus Phil. Darunter einige Exemplare, welche dem Unio littoralis sehr ähnlich sind.
6. Sphaerium rivicola Leach; schöne grosse Exemplare.
7. Sphaerium solidum Norm; ziemlich reichlich.
8. Sphaerium n. sp. Dem Sph. corneum ähnlich.
9. Pisidium supinum Schmidt.

Ich möchte hierbei darauf aufmerksam machen, dass die Muscheln des Sphaerium corneum in den grösseren Flüssen eine starke Schale erhalten, auch häufig durch die Form des Umrisses und die Gestalt der Cardinalzähne von der typischen Form des Sph. corneum so sehr abweichen, dass ich geneigt bin, in denselben eine gute neue Art zu erblicken.

S. Clessin.

Literaturbericht.

Pfeiffer, *Dr. L.* Novitates conchologicae. I. Landconchylien. Lief. 40–43.

Enthalten namentlich die von Mousson beschriebenen neuen Arten von den Canaren, sowie die durch Thomson in den Verkehr gebrachten von Toekun-Bessi. (Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass diese Inseln, deren Lage etwas problematisch scheint, auch von Rumph im Amboinesischen Raritätenkabinet citirt werden, als Fundort für Cassis aspera, Taf. XXIII. Bd. II.; sie sollen seitwärts von Boeton liegen. Auch Valentyn bestätigt diesen Fundort.

Journal de Conchyliologie, 3. Serie. Tom. XIII. No. 2.

p. 101. *Mousson, Alb.*, Faune malacologique de quelques îles de l'Océan Pacifique occidental. Sixième article. (Behandelt die Fauna der nördlich von den Samoa-Inseln gelegenen Ellice-Inseln und der südlich zwischen den Fidschi-Inseln und Neuseeland gelegenen Insel Norfolk, sowie der unter gleicher Breite zehn Grad östlicher liegenden Kermandec-Inseln. Von den Ellice-Inseln werden als neu beschrieben: Pithys decemplicata, Helicina musiva Gould var. rotundata, von den anderen Vitrina ultima, Trochonanina exposita, Patula modicella Fér. var. vicinalis, Omphalotropis albocarinata.)

p. 116. *Crosse et Fischer*, Note sur l'habitat des Helix Chastellii Fér. et H. Fulgurata Sowb. (Für beide wird Madagascar als Vaterland nachgewiesen.)

p. 118. *Sauvage, H. E.*, Note sur quelques points de l'histoire naturelle du Patella vulgaris.

p. 122. *Sauvage, H. E.*, Note sur l'accouplement des Littorina rudis et L. littorea.

p. 123. *Fischer, P.*, Sur la coquille embryonaire des Xenophora.

p. 124. *Morelet, A.*, Deux Coquilles de l'Equateur. (Cylindrella aequatoria und Chondropoma aspratile, beide aus der Umgebung von Quito.)

p. 126. *Fischer, P.*, Diagnoses specierum novarum. (Turbo carduus unbekannten Fundorts, stenogyrus von den Philippinen.)

p. 127. *Schramm, A.*, Note sur l'habitat du Succinea patula Brug. (nur auf Guadeloupe und noch nicht mit dem Thiere gefunden).

p. 129. *Crosse*, Description d'espèces inedites provenant de la Nouvelle-Calédonie (sämmtlich schon publicirt).

p. 133. *Crosse*, Description d'une nouvelle espèce de Clausilia du Japon (Cl. Yokohamensis).

p. 136. *Lambert*, Description d'un Helix inedit, provenant de la Nouvelle-Calédonie (H. Megei).

p. 136. *Crosse*, Diagnoses Molluscorum novorum (Scalaria Mariei von Noumea, Rumina decollata var. maura aus Marocco, Helix Rodriguezensis, Gonospira Dupontiana, Rodriguezensis, chloris, Pupa Desmazuresi, Lenardiana, Succinea Nevilli, Cyclostoma haemastomum var. Rodriguezensis, Cycl. Desmazuresi, Omphalotropis taeniata, littorinula, Hameliana, Planorbis Rodriguezensis; sämmtlich von der Insel Rodriguez).

p. 145. *Mayer, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires superieurs (suite). (Buccinum Beyrichi, cancellariiforme, cingulatum, collaterale, hungaricum, Jani, Paretoi, procerum, reconditum.)

p. 154. *Tournouër, R.*, Description de deux espèces de Natica des terrains miocènes du S. O. de la France (N. aquitanica und Sallomacensis).

p. 155. *Sauvage et Rigaux*, Diagnose complémentaire d'une Terebratule du Portlandien de Boulogne sur Mer (T. Bononiensis).

p. 156. *Crosse et Fischer*, Diagnoses Molluscorum novorum insulae Madagascar dictae incolarum (Euptychia metableta, eine neue Gattung zwischen Cyclostoma und Cyclophorus und Hel. stragulum).

p. 159. Bibliographie.

Möbius, Karl, Die wirbellosen Thiere der Ostsee; mit Unterstützung der Professoren K. Kupffer, E. Haeckel, O. Schmidt und des Dr. Bütschli bearbeitet von . . . .

Aus dem Bericht über die Expedition zur physikalisch-chemischen und biologischen Untersuchung der Ostsee im Sommer 1871 auf S. M. Avisodampfer Pommerania. (Wir werden diesen wichtigen Beitrag zur Fauna der deutschen Meere demnächst ausführlicher besprechen.)

Wiechmann, Conchyliologische Mittheilungen.

Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen mit der Drake, welche die Herren Arnold und Lenz in Travemünde angestellt haben. Neu für die Ostsee ist Utriculus obtusus Mtg.

Wiechmann, Die Zerstörung der Schalen bei Limnaea stagnalis L.

Der Verfasser hat direct beobachtet, dass einzelne Exemplare von anderen angefressen werden, namentlich im ersten Frühjahr.

Lenz, *H.*, Loligo vulgaris Lam. in der Untertrave.

Ein Männchen dieser für die Ostsee neuen Art, ohne die Arme 30 Ctm. lang, wurde am 24. Sept. 1872 an einer nur schwach salzhaltigen Stelle der Trave, 1/4 Meile oberhalb Travemünde gefangen.

Weinkauff, *H. C.*, Catalog der im europäischen Faunengebiete lebenden Meeresconchylien. Kreuznach, bei R. Voigtländer, 1873.

Wir kommen auf diesen Catalog, der mit Einrechnung der Nacktkiemer und Kopffüsser 1300 Arten umfasst, ausführlicher zurück. K.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Neue Mitglieder.

174. Herr Realschullehrer *C. Arndt*, Bützow, Mecklenburg.
175. „ *Dr. Calwer*, Sulz am Neckar.
176. „ *G. B. Adami*, Capitano Comandante la 13ª Compagnia Alpina, Edolo, Prov. Brescia.

Wohnungsveränderung.

Herr *Dr. O. von Möllendorff* wohnt in Zukunft in ***Peking***, deutsche Gesandtschaft; Paquete u. dgl. durch die Buchhandlung von H. Tzschaschel in Görlitz, Schlesien.

Eingegangen für die Normalsammlung und *Eingegangen für die Bibliothek* in nächster Nummer.

Mittheilungen und Anfragen.

Mit der Bearbeitung der Gattungen Turbinella, Fasciolaria, Pyrula, Neptunea und Fusus für die zweite Ausgabe des Conchylienkabinets von Martini-Chemnitz beschäftigt, bitte ich unsere Mitglieder, mich durch Zusendung kritischen Materials, besonders aus der Gruppe Latirus, zu unterstützen. Auch wünsche ich Arten der genannten Gattungen gegen baar oder in Tausch zu erwerben.

Schwanheim, Mai 1873. Dr. W. Kobelt.

Meinen P. T. Tauschfreunden theile mit, dass ich zum Neujahr befördert wurde und meine Adresse nun lautet: Via dei forni 10, Triest.

Jos. Ullepitsch.

☞ *Nebst Beilage: Tauschkatalog No. 2.*

Eingegangene Jahresbeiträge.

Von den Herren: Arndt, Wiechmann, Colbeau, van den Broeck, Craven, Malzine, Staes, Weyers, Piré, Thielens, Krefft, Degen, Westerlund, Calwer.

Redigirt von D. F. Heynemann. Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.